



בעיות מילוליות כיתה ג' - מתקדם · דף 2

קראו את הסיפור, כתבו תרגיל ותשובה עם יחידה. (בעיות של שני שלבים)

תאריך:

כיתה:

שם:

שלבים מה נתון? מה שואלים? תרגיל תשובה במילים

1 בכל שקית 4 תפוחים. קנינו 4 שקיות ואכלנו 10 תפוחים. כמה תפוחים נשארו?

2 כרטיס למבוגר עולה 58 ₪ וכרטיס לילד 22 ₪. כמה ישלמו מבוגר אחד ו-2 ילדים?

3 לאיתי היו 53 ₪. בכסף הזה נקנו 3 מחברות, כל אחת ב-3 ₪. כמה כסף נשאר?

4 בחניון 4 קומות, ובכל קומה 41 מקומות. 18 מקומות תפוסים. כמה מקומות פנויים?

5 בכיתה 18 בנים ו-12 בנות. הם התחלקו ל-5 קבוצות שוות. כמה ילדים בכל קבוצה?

6 בחנות היו 226 כדורים. נמכרו 187, ואחר כך הגיעו עוד 47. כמה כדורים יש עכשיו?

7 ביום ראשון אספו 26 בקבוקים, וביום שני פי 3 יותר. כמה בקבוקים אספו בשני הימים?





פתרונות - בעיות מילוליות כיתה ג' - מתקדם • דף 2

לבדיקה אחרי שפתרתם לבד.

2 102 ש

$$22 \times 2 = 44 \cdot$$
$$58 + 44 = 102 \cdot$$

1 6 תפוחים

$$4 \times 4 = 16 \cdot$$
$$16 - 10 = 6 \cdot$$

4 146 מקומות

$$4 \times 41 = 164 \cdot$$
$$164 - 18 = 146 \cdot$$

3 44 ש

$$3 \times 3 = 9 \cdot$$
$$53 - 9 = 44 \cdot$$

6 86 כדורים

$$226 - 187 = 39 \cdot$$
$$39 + 47 = 86 \cdot$$

5 6 ילדים

$$18 + 12 = 30 \cdot$$
$$30 : 5 = 6 \cdot$$

7 104 בקבוקים

$$26 \times 3 = 78 \cdot$$
$$26 + 78 = 104 \cdot$$

הסבר קצר: איך פותרים בעיה של שני שלבים

- קוראים את כל הסיפור ומסמנים את השאלה.
- שואלים: מה חסר לי כדי לענות?
- מחשבים קודם את מה שחסר.
- משתמשים בתוצאה בתרגיל השני, ועונים במשפט.

דוגמה פתורה

בכל שקית 6 תפוחים. קנינו 4 שקיות ואכלנו 5 תפוחים. כמה נשארו?

$$6 \times 4 = 24$$

$$19 = 24 - 5 \text{ תפוחים}$$

טעות נפוצה: לחבר את כל המספרים בסיפור בלי להבין אותו. קודם שואלים מה קרה: קיבלו עוד, נתנו, או התחלקו שווה בשווה.

